

Calendrier des vaccinations 2023

Nouvelles recommandations

Rotavirus

- Chaque année, les gastro-entérites aiguës dues au rotavirus sont responsables 60000 consultations, 20000 hospitalisations et 3 décès.
- Depuis juin 2022, la HAS recommande la vaccination des nourrissons de 6 semaines à 6 mois
- Ce vaccin est déjà pratiqué dans 28 pays européens

Recommandations 2023

- Vaccination **recommandée chez tous les nourrissons**
- Schémas vaccinaux:
 - ROTARIX® (monovalent) : 2 doses à 2 et 3 mois
 - ROTATEQ® (pentavalent) : 3 doses à 2, 3 et 4 mois
- Critères généraux:
 - 1^{ère} dose au plus tôt à 6 semaines
 - Minimum 4 semaines entre chaque dose
 - **Dernière dose au plus tard à 6 mois pour le Rotarix et 8 mois pour le RotaTeq**
- CI définitives: Hypersensibilité à un composant du vaccin, Immunodéficience combinée sévère, anomalies digestives congénitales à risque d'invagination, antécédent d'invagination intestinale
- CI temporaires: maladie fébrile, nausées et vomissements

Grippe

- Vaccination possible chez les **enfants entre 2 et 17 ans révolus sans comorbidités**
- Vaccins recommandés:
 - Vaccin vivant atténué intra-nasal: FLUENZ TETRA® (non disponible en France)
 - Vaccins inactivés: FLUARIX TETRA®, VAXIGRIP TETRA®, INFLUVAC TETRA®, FLUCELVAX TETRA®
- Schéma:
 - Lors de la 1^{ère} vaccination, 2 doses à au moins 4 semaines d'intervalle
 - 1 dose chaque année lors des vaccinations suivantes
- Intérêts:
 - Protection des enfants sans comorbidité contre la grippe
 - Diminution de la circulation des virus de la grippe dans la population générale
 - Pas de signal concernant les données de sécurité et de tolérance de ces vaccins chez les enfants
- Les autres indications: 65 ans et plus, grossesse, personnes à risque dès l'âge de 6 mois, personnes en situations d'obésité, entourage de nourrissons de moins de 6 mois avec des facteurs de risque graves, entourage des personnes immunodéprimées

Méningite ACYW

- Nouveau vaccin disponible depuis fin 2022: **MENQUADFI**[®] de Sanofi Pasteur
- Option supplémentaire en plus des deux vaccins déjà disponibles en France: MENVEO[®] (GSK) et NIMENRIX[®] (Pfizer)
- Indication notamment dans le cadre des voyages
 - Pèlerinage à la Mecque (validité de 5 ans pour les vaccins conjugués)
 - Afrique sub-saharienne (ceinture méningée) pendant la saison sèche

Dengue

- La vaccination par le vaccin DENGIVAXIA® peut être proposée aux personnes de 6 à 45 ans vivant dans les territoires français d'Amérique et apportant la preuve documentée d'une infection antérieure par le virus de la dengue.
- Cette indication concernait les personnes de 9 à 45 ans. L'extension de l'indication permet aujourd'hui de le proposer aux personnes de 6 à 45 ans.
- Pour rappel, en outre-mer (Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Guyane), ce vaccin n'est pas recommandé en population générale ni aux personnes qui s'y rendent.

Sages-femmes, pharmaciens et infirmiers

En 2022

- Elargissement des compétences vaccinales des IDE et pharmaciens en 2022 à **l'administration des vaccins non vivants chez les personnes de 16 ans et plus** sans prescription préalable de l'acte d'injection
- Les vaccins concernés sont les **vaccins non vivants**: grippe, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, HPV, pneumocoque, VHA, VHB, Men ABCYW, rage.

En 2023

- Nouvelle extension des compétences prévue en 2023
- Ouverture de la compétence de pharmaciens et infirmiers (et laboratoire de biologie) à la **prescription et l'administration de vaccins**
- Elargissement à l'ensemble de la population des compétences vaccinales des sages-femmes

A venir

- Les recommandations concernant les **vaccinations Hib et méningocoques** pourraient être modifiées en fonction de l'évolution du nombre de cas chez les enfants
- Les **recommandations vaccinales pour les personnes immunodéprimées** devraient être mises à jour cette année (dernières recommandations du HCSP datent de 2014)
- Possibilité d'enregistrer les vaccins dans « Mon espace santé ». La fonctionnalité de ce carnet de vaccination du DMP est très limitée. Le **CVI devrait rejoindre l'espace numérique de santé** et permettre des échanges avec le DMP.

COVID 19

- Les recommandations pourront évoluer en fonction du contexte épidémiologique
- Depuis février 2023, la HAS propose les préconisations suivantes :
 - Dose de **rappel à l'automne 2023 pour toutes les personnes à risque de formes graves**. Rappel à coupler à la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière.
 - Dose de **rappel au printemps 2023 pour toutes les personnes à très haut risque de formes graves** (notamment plus de 80 ans et immunodéprimés). En respectant un délai d'au moins 6 mois depuis la dernière dose ou infection
 - La **primo-vaccination** n'est plus recommandée en population générale

Monkeypox

- Vaccination des **sujets contacts (vaccination post-exposition) et des personnes à très haut risque d'exposition** depuis juin 2022
- Recommandations mises à jour par la HAS en janvier 2023
- Schémas vaccinaux
 - Avec les vaccins de 3^{ème} génération: IMVANEX® et JYNNEOS®
 - 2 doses par voie sous-cutanée avec un intervalle d'au moins 28 jours entre les deux doses
 - 1 seule dose chez les personnes vaccinées contre la variole humaine (vaccin de première génération disponible avant 1978)
 - En post-exposition, la 1^{ère} dose doit être administrée dans les 4 jours après le contact (et au maximum 14 jours plus tard)

Merci pour votre attention